

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00447&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00447. Змішане захворювання сполучної тканини (ЗЗСТ)

Автор: Tom Pettersson

Редактор оригінального тексту: Anna Kattainen

Дата останнього оновлення: 2017-08-01

Визначення та епідеміологія

- Змішане захворювання сполучної тканини (ЗЗСТ) є рідкісною патологією, для якої характерні ознаки ревматоїдного артриту, СЧВ, поліміозиту і системної склеродермії, а також високий титр антитіл до рибонуклеопротейну.
- Клінічна картина різноманітна і змінюється з часом, нерідко схожа до клінічної картини системної склеродермії.
- Більшість пацієнтів - жінки віком 30–40 років.

Клінічний перебіг

- Майже у всіх пацієнтів спостерігаються артрит або артралгія
- набряк пальців кистей і синдром Рейно
- Шкірні прояви нагадують СЧВ
- М'язові симптоми нагадують поліміозит
- Можливі плеврит, кардит і нефрит, але вони більш характерні для СЧВ

Дослідження та діагностика

- Загальний аналіз крові, ШОЕ, СРБ, загальний аналіз сечі, креатинін плазми, креатинкіназа, антинуклеарні антитіла сироватки, ревматоїдний фактор
- Часто спостерігаються анемія, лейкопенія і тромбоцитопенія.
- ШОЕ зазвичай підвищена, але концентрація СРБ може бути нормальною або незначно підвищеною.
- Типовою ознакою є нерівномірне зафарбовування антинуклеарних антитіл
- У спеціалізованому відділенні, наприклад, визначення антитіл до екстрагованих ядерних антигенів: виявляються антитіла до ядерного рибонуклеопротеїну. Діагноз встановлюють в умовах спеціалізованої медичної допомоги.

Лікування

- Нестероїдні протизапальні протиревматичні лікарські засоби (не сульфасалазин) при артриті
- Низькі дози глюкокортикоїдів при загальних симптомах
- Високі дози глюкокортикоїдів при тяжких органних проявах
- Як і при СЧВ, напрям лікування залежить від клінічної картини.

Пов'язані джерела

- Інтернет-джерела [пов'язані 00769] [Mixed connective tissue ...](#)

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm00447 Ключ сортування: 021.042 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2017-08-01

Автор(и): Tom Pettersson Редактор(и): Anna Kattainen Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Internal medicine Rheumatology

Ключові слова індексу
Mixed Connective Tissue Disease Mixed connective-tissue disease MCTD speciality: Internal medicine
speciality: Rheumatology mesh: ENA antibodies mesh: Arthritis icpc-2: L99